

瘍

醫

大

全

瘍醫大全目錄

卷二十九

癩癬部

蛇虱門主論

烏白癩門主論

辨六經癩形

疥癩門主論

癬門主論

附方

癰疽門主論

附方

葡萄疫門主論附方

濕痰流注門主論附方

腹痛門主論

傷寒瘧後發腫門主論

傷寒身癢門主論

腫塊門主論附方

汗斑門主論附方

瘍醫大全卷二十九

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽

男 樵燮用和

全校

癩癬部

自蛇虱烏癩癬癰起至濕痰流注止皆彙於此部中
以便檢閱參治

蛇風門主論

王肯堂曰蛇風遍身起如風癰疥丹之狀其色白不

痛但搔癢狐之起白疣

柏葉一味煎水洗

內服蠟礬丸金

銀皂角丸

準繩

心法曰白疣俗名蛇風生於皮膚形如疹疥色白而
癢搔起白皮由風邪客於皮膚血燥不能榮養所
致用猪油苦杏仁等分搗勻絹包擦

烏白癩門主論

王肯堂曰夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺
皮毛變黑或淫淫苦癢如蟲行或眼前見物如垂
絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如桃李癰瘡
赤黑手足頑麻針刺不覺痛脚下頑痛不得踏地
凡食之時開口出氣而鳴語亦如是身體生瘡痛
癢而時如蟲行或兩肘如繩縛此名烏癩又有黑
癩凡二癩之證大同小異故不別錄也

準繩

又曰白癩者其語聲嘶啞目視不明四肢頑痛身體

大熱心中懊惱手脚緩縱背脊拘急內如針刺或生癰瘡而起往往正白在皮肉鼻有瘰肉目生白珠擋於瞳子視無所見名曰白癰也

陳實功曰癰風乃陽明濕熱沸騰於肌表或受風寒侵襲而成其患初起水泡作癢成瘡破流脂水癢至徹骨久則成片延及遍身好浴熱湯形如風癰上體者汗解外毒下體者疏瀉內毒爲主 正宗

陳遠公曰八一身發癰皮厚生瘡血出如疥或痛或癢或濕或乾似蟲非蟲人以爲濕熱留於皮膚誰

知乃氣血不能週到滋潤乎世多以苦參煎湯或
稀煎白芷外治不能奏效正成於氣血虛也夫氣
血足則經絡無閉塞之虞氣血旺則毛竅無乾枯
之患且氣足血旺則熱散濕消何至瘀滯不通結
於皮膚之外哉治法以補氣血爲主佐以消濕散
熱雖十載沉疴尚可奏功矧目前近癩乎用掃癩
丹黃芪三兩當歸金銀花各二兩白朮茯苓麥冬
白芍熟地玄參各一兩山萸川芎各五錢生甘草
荆芥花粉各三錢防風二錢水煎服皮色卽潤二

劑乾燥解十劑全愈 水鑑

此方大補氣血無異枯涸之田逢甘霖之滂沛生機勃勃水滿平疇而璽璫之類自消於無形矣

沈紫亮十四種癩症歌訣

心經火癩蟋蟀連 肝經木癩風厲偏

脾經土狗癩併屬 肺經金癩麤白兼

腎經水癩雨烏共 胃經酒麻癩總言

夫癩之爲害較之風症稍輕然其致害之患一也但癩愈而形可復瘋愈則元氣雖復癩死者少瘋死者多然皆非善症耳 醫學要則

辨六經癩形

心經 火癩如灼之瘡大小不一或形如癬裂斷皮
膚愈而復發乃心臟受毒病深七年方盛其
蟋蟀癩亦乃心經毒也

肝經 木癩初起似蝕癬狀大小不同形色不一或
遍身高低不定俗呼爲綿花癬

脾經 土癩或先發熱嘔吐身發黃腫卽現癰塊大
如鷄卵小如彈丸或麻木不仁穿卽成瘡膿
氣臭穢難聞

肺經 金癩初發如楊梅毒上無殼內泛碎肉凸起

紫赤潰爛直如楊梅毒入肺經眉睫耗落二
年鼻梁崩倒眼塌唇翻乃金癩之驗若蠱蟲
食肺腑致生麪白細蠱舉體艾白斑駁週身
如癬儼然泥壁風之狀外用薰洗則能取效
白癩乃風寒暑濕之氣邪毒湊聚彌滿肺竅
久則蠱蟲食肺管所致

腎經

水癩必先得水病而停蓄又爲風濕觸激或
生在陰莖蝕於陰囊兩傍發腫塊橫痃寒熱

交作腫痛難忍漸大而潰變成爛瘡一年病
劇眉髮墮落水癩之毒在腎濕久生蟲流注
遍身則生青黑赤紫斑駁以致陰莖痿癩皮
穿肉爛膿血臭穢烏癩乃邪毒入腎蟲食精
髓下虛不救若在胸肋脇腿臂肋之間生核
如桃李之狀穿爛臭惡或似漏瘡或如癰疹
手足頑痺針刺不知此種之症宜大補氣血
酒癩因醉臥汗出迎風邪入於胃所致似赤
非赤似白非白大者如錢小者如莛此症最

胃經

爲難治麻癩由酒毒留滯胃腑遍發瘡毒狀
如疥癬痛癢難忍或手足發黑白頑痺形如
雁來鵞掌瘋之狀或發內痔頭硬而碎形如
鱗頭遍體皆然觸之則大痛冷汗一時卽愈
瘋與癩大同小異但癩輕而瘋重治癩之法可於瘋
症門中諸方酌用

瘡癰門主論

王肯堂曰夫人陽氣外虛則多汗汗出當風風氣搏於肌肉與熱氣併則生瘡癰狀如麻豆甚者漸大搔之則成瘡也

準繩

心法曰瘡癰俗名鬼飯疔瘡由汗出受風或露臥乘涼風邪多中表虛之人初起皮膚作癢次發而疔瘡形如荳瓣堆疊成片日間癢甚者宜秦艽牛蒡湯夜間癢甚者宜當歸飲子外用燒酒浸百部以藍布蘸酒搽之謹避風涼

癬門主論

陳寶功曰癬乃風熱濕蟲四者而成風宜散熱宜清
濕宜滲蟲宜殺總由血燥風毒尅於脾肺二經耳
正宗

又曰風癬如雲朶皮膚嬌嫩抓之則起白屑不知痛
癢

又曰濕癬如蟲形搔之則有汁出

又曰頑癬抓之全不知痛

又曰牛皮癬頑硬且堅抓之如朽木

又曰馬皮癬微癢白點相連

又曰狗皮癬白斑相簇時作微癢

周文采曰乾癬搔之則出白屑索然彫枯

集驗

又曰刀癬則輪廓全無縱橫不定

申斗垣曰白殼瘡卽癬也

啟玄

王肯堂曰面上風癬初起痞癰或漸成細瘡時作痛

癢發於春月名曰花癬女人多生之此皆肺經蘊

積風熱陽氣上升發於面部或生眉目之間久而

不愈恐成風疾

準繩

蔣示吉日上半身為頑癰治之易多屬風熱

說約

又曰陰癰生在下半身治之最難多屬寒濕總之血分受病以致皮膚不和也

癰門主方

浮萍散

治風癰疥癩

當歸 川芎 荊芥 赤芍藥

甘草 浮萍 七月十五日採取陰乾
各一錢五分

麻黃 七分五厘夏
月只用三分

加葱白二根豆豉五六十粒水煎熱服取汗

手臂加桂枝 背加羌活 膝加牛膝薄桂

遍身風癰

防風

金銀花

片苓

山梔仁

生地黃

木通

川黃連

當歸

苦參

錢各一

飛滑石

升麻

各三分

荊芥穗

香白芷

各七分

桔梗

生甘草

各五分

蟬蛻

皂針

牛蒡子

各八分

生薑

一片

穿山甲

四片

水二鍾煎八分食遠服

未服藥先一日用茹

子藤連根葉煎水薰洗將癬擦透次日服藥三

劑除根

濕熱生癬

乾薄荷 一兩

蒼耳子

蒼術

苦參 各一兩 五錢

黃芩 五錢

香附米 二錢五分

酒糊丸 上身多食後服 下身多食前服 白湯送

下三錢

搽癬

土槿皮 一兩

斑蝥 二個

鷄心檳榔 三個

番木鱉 四個

火酒半觔 浸一伏時 蘸搽癬上 忌大蒜火酒

又方

硫黃

輕粉 各等分

研勻蜜調搽

又方

大棗一枚去核入白砒三分泥裹煨透冷定去泥
研細香油調搽

又方

密陀僧五倍子各等分研細蜜調搽

又方

土槿皮研細醋調敷以紙蓋之

又方

商陸根蘸蜜擦之

又方

土槿皮研細粗夏布包裝浸火酒一伏時擦之

又方

薺菜根蘸人乳擦之

又方

白降丹

三分

輕粉

七分

醋調擦之

又方

土大黃

鳳仙花梗

枯白礬 水飛

共搗蘇布包裝蘸醋擦之

又方

白砒

硫黃

罐口 各等分

入杓內化開將地下挖一孔將藥傾入冷定取出米醋磨敷

又方

硫

黃 三錢

枯

礬 一分

白

芷

三分

斑

貓 三個去翅足

研勻抓破擦之

又方

樹上經露水的蜂房一個以生礬填滿房孔置罐底以細火煨令礬化為度取出研細抓破擦之

又方

牛舌草

即土黃

白薇

棟樹皮

各一兩

冰片

甘草

各一錢

輕粉

蝸

牛

各三錢焙乾如無活的殼亦可用

共研細用荔枝核將癰抓破直蘸油調擦

又方

皂礬炒研猪胆汁調搽

又方

鮮土大黃搗爛如川椒白糖鹽各少許用布包入醋內浸半日取起擦癰

又方

生天南星生草烏各等分研細用土大黃汁調搽

又方

猪蹄鞋內填生白礬瓦上煨存性搽之

又方

蛇床子

藁本

尖檳榔

硫黃

枯礬

白膠香

五倍子

各等分

研細乾癬香油調擦濕癬乾擦頑癬醋調擦

又方

土槿皮

三兩

明雄黃

水銀

各二錢

湖腦

一錢

檳榔

七分

麝香

一分

大楓子

斑貓

木鱉子

各七枚

研細入火酒觔半封一七蘸搽

百部膏

治牛皮癬

百部

白蘚皮

鶴虱

葶藶仁

生地黄

黃栢

全當歸

各一兩

麻油半觔入藥熬枯去渣復熬至滴水成珠再下黃蠟二兩試水不散爲度拿起鍋入雄黃末和勻稍冷傾入磁鉢中收貯退火氣聽用

三五十年頑癬

鐵線粉

出廣西要對換

海金砂

冰片

麝香末 各等分

生薑蘸擦

又方

枯白礬七分 血丹三分 研勻 土大黃根全搗搽

又方

土槿皮 三兩 公檳榔 一兩

不見火晒乾磨細用好滴醋調如薄糊隔水蒸
一炷香取出敷患處棉紙蓋上二三次即愈

又方

生白朮

三兩

土槿皮

錢一兩五

不見火晒乾爲末滴醋調搽三次必愈

又方

先用生薑汁搽再用栢油搽

頑癬陰癬

土槿皮

二兩

斑

貓

十四枚

明雄黃

礪

砂

各六錢

火酒二觔浸三日搽之

項上耳傍濕癬

蘆薈 一兩
甘草 五錢

研極細先將癬以溫水洗淨拭乾搽之

厚牛皮癬

全蠍 七個
芭荳 二十粒
斑猫 十枚

蘇油 一兩
黃蠟 一錢

先將芭蠍斑猫入油熬黃焦色去藥取油如油少可加蘇油煉滾投蠟熔化收貯擦之

又方

土地黃根搗爛和蜜擦癬

頑癬

大公蝦一個取蝦大瓜抓破癬見血路爲度卽以
蝦腦塗之二次卽消

陰癬

生明礬

熟明礬 各一錢
輕粉 二錢

銀硝 三分

研細用土地黃根搗爛布包蘸藥末擦之

頭項以上癬

用傾過銀子的銷鑪子大小二個盛硫黃一兩於

大罐內以小罐覆住文武火煨俟火焰高罐上一寸約一鍾茶時取出冷定取上覆罐研爲細末用栢油猪骨髓調勻將癬用刀剝破搽上一伏時愈又方

旱蔞草生擦癬覺疼起泡挑破再擦三日不見水結疤永不再發

又方

硫黃細末拌生猪油熬熟將癬抓破搽擦自愈

治癬碧玉散

銅綠礪砂白礬各等分研勻香油調搽

岐天師神方 秘錄

棟樹皮

大楓子

潮

腦

各三錢

水

銀

硫黃

花椒

炒

木鱉子

明雄黃

蟬蛻

木通

各二錢

全

蝎

二個

土槿皮

四兩

斑貓

公檳榔

各七個

皮

硝

五錢

用火酒三四觔浸十日擦

又方

蘆薈

輕粉

雄

黃

各一錢

大

黃

蛇床子

土槿皮

各三錢

檳

榔

二錢

研末先將癬刮破以米醋調搽

頭面荷葉癬

川槿皮研細醋調湯頓如膠將癬抓破搽之

白礬散

遍身生癬日久不愈延至頭面

獨莖羊蹄根搗細白礬研細以極酸米醋調勻抓

破搽癬隔日再搽不過兩次即愈

又方

紫蘇 潮腦 蒼耳草 浮萍

煎湯洗癬

牛皮血癬

舊銀罐 一個

露蜂房煨灰五錢 枯礬 二錢

研細香油調搽

年久陰癬數日除根

土槿皮 五錢

露水

鏡面燒酒 各四兩

全浸七日抓破癬皮用新羊毛筆塗之每日數

次

千金方 孫真人

以日午時立日光下人影有癬處着艾灸之點艾
時念咒 呪曰癬中蟲毛戎戎若欲治待日中
一氣唸三遍俟艾火過添火再唸再灸如此三遍
三炷卽愈

癬瘡延蔓 東坡家藏

決明子 一兩研細 水 銀 輕 粉 各少許

再和研不見水銀星爲度刮破上藥立瘥

又方

銅青

雄黃

斑毛

各等分

研勻無根水調敷起泡刺破柏燭油搽潔淨不發

又方

杜黃連

卽羊蹄根一握洗淨搗濾汁

白

梅

數枚去核

全汁搗爛用穿山甲刮破搽數次卽愈

荷葉癰

古方

田螺一個開鑿入信石二分待肉化水搽上卽愈

牛皮癬及多年頑癬

紅粉霜

五分卽紅昇丹

明礬

杏仁

去油皮

川槿皮

各一錢

密陀僧

三錢

共研細津調搽一日三次三日全愈

又方

牛皮燒灰油調搽

牛皮血癬

古仙方

硫

黃

九分

白

砒

一分

巴

豆

油三粒去

研細茶油調搽

頑癬

秘方

白砒一分 硫黃九分 白硝三分

明礬四分 冰片五厘

研末津調擦之

楊梅癬

枯白礬 硫黃各一兩 雄黃八錢

膽礬 輕粉各一錢 川椒三錢

研細用生豬板油去皮入藥擦破數次其效如

神

楊梅癬

硃砂

雄黃

沒藥

去油

乳香

去油

兒茶

各一錢

杏仁

四十粒

大楓肉

二十粒

搗爛絹包擦之

驚掌瘋癲

秘錄

川烏

草烏

何首烏

花粉

赤芍藥

防風

荊芥

蒼朮

地丁

各一兩

艾葉

四兩

煎湯先薰後洗層層起皮痛癢自愈

圈子癬

集驗

穀樹皮剪如癬樣大小以毛背一面用唾貼癬上
以手不時撲之即愈

癬方

硫黃

木炭灰

各等分

又方

共爲極細末將癬用穿山甲刮破擦上數次愈

馬蹄決明子一兩爲末入水銀輕粉少許研不見

水銀星爲度將癬刮破擦上立愈

又方

馬蜂窩一個仰放瓦上以枯礬末填滿孔內炭火炙焦研末用臘醋調塗卽愈

陰癬

鮮旱蓮草揉成團用穿山甲將癬刮破擦癬上奇驗

渾身癬

羊蹄根搗汁入墨盆內將白芨磨濃汁搽之

又方

鉛一觔煎水日洗數次即愈

川槿皮錠 劉長隨

治一切癬如神

烏梅肉

半觔用羊蹄根汁浸一夜次日重湯燉一炷香又放飯鍋上蒸軟透取出搗如泥

加番打麻

研細一兩

海螵蛸

研細五錢

入烏梅內又搗勻

稱過每一兩加白降丹

八分

白砒

七分

再搗勻

人白芨細末一錢又搗勻做成二三錢重的錠

子陰乾收貯凡用以羊蹄根同醋磨濃搽之

癬方 胡繡谿

土荆皮 三兩

尖枳殼

斑 猫 去頭足
糯米炒

大楓子

木鱉子 各七
個

巴荳仁 五個

雄 黃

潮 腦

川 烏

白蘚皮

草 烏 各二
錢

麝 香 三分

火酒二觔半全入小口瓶內封口浸七日將癬

刮破搽之

頑癬

黑鉛一錢熔化離火入水銀一錢研爲極細末加

直輕粉潮腦各一錢和勻再研細取牛舌草根去
土淨搗自然汁和勻再用穿山甲將癬刮破敷上
出盡血水爲度癢時則頻頻搽之搽時微痛勿懼
頑癬癰瘡及湯火傷

盛惟章

真川鉛粉

銀

硃

各五錢

麝

香

三分

右爲末用鷺油搥和如泥用油紙一長條將半
段用針刺孔攤膏合轉來將光面貼癬絹帕縛
緊二三日一換夏月早晚換

牛皮癬

穿舊牛皮靴鞋底上皮陰陽瓦煨存性研細將癬刮破擦之

癬

鷄蛋一個開一小孔去白存黃入硫黃川椒末各三錢將濕紙封固灰火內煨熟爲末先以蔴線將癬刮破用穀樹漿或羊蹄根汁調搽

又方

多年竹燈掛一個火上烤出汁如膠者另將五倍子去更炒爲末和勻用陳醋在火上溫熱調搽

頑癬

硫黃 一兩

火硝

白

砒 各一錢研

先將硫黃入銀罐內化開再入硝砒末攪勻傾入土內埋七日搽三五次

癬

雷公籐 五分

大楓肉

防

風 各一錢五分

土槿皮

蚯蚓糞

牛舌草根

各三錢

共爲末陳醋調搽

牛皮癬

桃樹根全膽礬搗爛敷

癰生臉上如錢大抵之有白屑者

菜豆捶碎以紙糊碗口上針戳多孔以碎豆鋪
帑上放紅炭一塊架荳上俟荳灼盡紙將焦去豆
揭紙碗中有水取搽三五次

老癰

輕粉 雄黃 黃丹

銀 硃 各等分

研細用米醋浸大黃夏布包蘸藥擦之

陰癬

鹽內皂角擦之

燥癬

水銀 胡粉

研蛋清調搽

又方

雄鷄冠血塗

又方

胡粉

炒黃赤色 醋調塗

又方

搗桃樹白皮醋和塗

濕癬

石硫黃研用三年陳醋調敷

又方

蛇床子

黃栢

黃連

胡粉

各一兩

研細入水銀一棗子大和猪油研勻塗之

又方

用粗碗一隻以皮紙用針戳眼糊碗口上以水潮
紙上令濕將杉木屑堆潮紙碗上用火點着俟杉
木屑燒將盡輕輕掃去屑灰揭開紙看碗中杉木
油取搽癰上必效

癰癧門主論

孫真人論曰素問云風邪客於肌中則肌虛眞氣發散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛搖氣妄行之則爲癢也所以有風疹瘙癢皆由於此又有赤疹者忽然起如蚊蟲咬煩癢極者重抓疹起瘙之逐手起又有白疹者發冷亦有赤疹蓋赤疹者發熱王肯堂曰夫風癰疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒相搏則爲癰疹若赤疹者由冷濕搏於肌中風熱結成赤疹也遇熱則極若冷則瘥也白疹者由於

風氣搏於肌中風冷結爲白疹也遇冷則極或風中亦極得晴明則瘥着厚煖衣亦瘥也其脉浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相搏則爲癰疹致身體爲癢也

準繩

朱丹溪曰疹屬熱與痰在肺宜清肺火降痰或解散出汗亦有可下者

心法

方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相搏則成白疹赤疹得熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱於內故惡熱宜

冷白疹得陰雨則甚得晴則消蓋熱氣散釋於外
故惡冷宜熱熱搏於血分其邪因併發於表則赤
若風濕搏於氣分則氣脈不行因邪併發於表則
白夫如是然後與治法相應邪熱者故惡熱而喜
涼邪濕者故惡雨而喜晴矣方論中又有風痞癰
者卽內經所謂汗出見濕乃生痲痺又曰勞汗當
風寒薄爲鬱乃痲痺卽癰疹屬也故痞癰類也此
皆謂外邪鬱肌肉玄府之熱者矣然則與內經言
少陽少陰而君相二火客熱之勝爲丹疹外發者

方論中則無有也故人氣君相二火鬱發而變者
宜乎未之及耳若此條是人氣所變之一者也故
二火鬱發出血氣之表與外邪所鬱無異更有小
兒發痘瘡之外必有出疹二次亦是君相二火發
出未盡之胎毒也

又曰癰疹入腹亦能殺人

宜用蚕砂煎
濃湯洗之

又曰癰疹熱多則色赤風多則色白甚者癢痛搔之
則成瘡也

林氏曰或問斑疹因何而生屬陰屬陽屬虛屬實屬

表屬裏可得聞其詳乎答曰斑疹之發有外感風熱者有胃腑實熱爲病者有傷寒失下者有傷寒陽明經症失汗發衄不衄則發頤不生頤則發斑疹者總屬陽明胃與大腸之風熱亢盛已極內不得疎泄外不得透達怫鬱於皮毛腠理之間輕則爲疹重則爲斑一如火乘金位金受火尅之故此乃陽毒屬表屬實之斑疹也有陰虛血熱者有陽虛血熱者有氣血兩虛而虛熱鬱盛者此三焦無根之火乘氣血之虛而空發於上怫鬱於皮毛血

脈之中內不得清外不得散遂發斑疹乃陰虛屬裏之症也

活人錄

又曰或問何以爲斑何以爲疹陰陽旣別何者爲重何者爲輕答曰斑者成片不分顆粒一如雲朶拱起淡紅者輕紫紅者重黑者凶輕者癢而重者痛疹者如癩瘡或類蚊跡蚤虱痕而不盛一日之中起伏隱現不常隱隱見於肌膚之間不大起發者是大約陽症斑疹易看而易治陰症斑疹挾虛而發難看而難治苟不細審則陰症誤以爲陽立至

危殆可不慎歟

又曰身熱無汗煩渴躁悶或痛或癢如雲若錦腹痛
胸滿二便秘結六脉浮洪有力或浮數有力者係
手陽明大腸足陽明胃二經風熱爲病所謂陽斑
也若內熱自汗渴不欲飲心煩身躁胃弱脾泄喜
濕惡熱色白而不紅但癢而不痛六脉遲緩微弱
或虛數無力者手太陰肺足太陰脾手少陰心足
少陰腎經之陰火內亢爲病所謂陰斑也疹形雖
與斑異而致病之因受病之臟腑及所現之脉與

形症無不同蓋斑有陰陽則疹亦有陰陽自在醫者審其症之陰陽虛實脉之無力有力可也 一

又曰兩陽合明其火自盛兼有食積致生積熱故斑疹之因必歸過於胃與大腸也火盛則血熱而金燥蓋心爲火臟主血脉肺爲金臟主皮毛火聚胸中肺受薰蒸心火愈熾或熱極反兼風化或客風鼓動內火其病發於心肺二經所謂陽斑陽疹必先清散風熱於表疎導積熱於內表裏和解以救炎炎之勢如二便秘結急宜利之若脾腎之陰虛

火盛不能歸經固藏發越於上而心肺受其薰灼而病亦有因風致火或因熱極生風而發所謂陰斑陰疹初則亦宜清解使其透發寬其胸膈解其煩躁次則察脉之大小虛實脾胃之實與不實大便之結與不結或清補或溫補

又曰雖陰陽俱有斑疹而陽症發斑者多且多發於熱病之末陰症則發疹者多發於病之始蓋斑由積熱發之稍緩疹兼風火發之尤速發之速者禍輕發之緩者其禍反深則又天下事理必然之勢

也至於時氣發疹由風熱之邪乘於肺經必兼鼻
塞氣粗痰嗽餘熱不清遺於陽明大腸并其糟粕
蘊積而爲濕熱更成積滯自利甚至熱鬱化火火
性急迫隨氣滯下而後重不舒者宜用辛涼升散
之劑清其邪熱使鬱陷之氣透達外解不惟斑疹
自消而濕熱亦散矣若痰嗽不清加以清火消痰
之藥積滯有餘濕熱下迫加以分清利濁健運化
導之劑如木香黃連山查神曲車前澤瀉之類更
用枳殼寬胸開鬱升提鬱陷之邪

風濕鬱於腸胃風熱逆於肌表傷於血分則憎寒壯
熱胸中嘈雜肚腹疼痛發爲赤疹傷於氣分發爲
白疹俱令瘙癢無度一日三現三隱俗名風結疹
卽此是也第一宜忌香油蝦鮮麪食並戒酸鹹倘
不知禁戒輕則成瘡甚則不時舉發致成終身之
累治當疏風散熱托疹爲主

癰瘡門主方

通治陽症斑疹主方 活人錄

生地 三錢 防風 荆芥 各一錢五分

川黃連 犀角屑 牡丹皮 各五分

黃芩 桔梗 各一錢 甘草 三分

水煎不拘時服

血中伏火必先涼血和血故以生地為君而丹皮佐之芩連瀉心肺之火佐桔梗以開鬱結犀角清心家之熱毒而甘草佐之荆防用以解散內外之風邪外感重者加羌活一錢川芎薄荷各五分暫去芩連生地如陽明胃家熱毒煩躁熱渴無汗背寒斑疹黑紫色者速加石膏

一兩連翹一錢五分玄參一錢犀角五分去防
風桔梗傷寒邪熱入胃舌胎黃黑有刺二便
不通譫語狂熱者加大黃五錢芒硝三錢枳實
二錢去生地防風丹皮傷寒陽明失表煩渴
外熱半表半裏大便不去無下症者加乾葛三
錢牛蒡子二錢玄參一錢五分薄荷一錢去生
地丹皮黃連犀角

通治陰症斑疹主方

白朮二錢 白茯苓一錢五分 人參

炮薑各一錢 陳皮 炙甘草

防風各五分 肉桂三分

水煎早晚空心服

右方乃治陽虛血熱及氣熱血熱凡惡寒喜熱二便清利口不乾而反欲熱飲六脈沉微細數或虛數無神者宜之此氣虛不能統運血脈致血久鬱生熱而有風熱之變也

腎水不足龍火無制陡發越於上心肺受其薰逼而成斑疹者

八味地黃湯導火歸原兼服腎氣丸

治陰虛血熱熱鬱血中而生斑疹時發時止或疼久遠不愈者以此涼血清熱滋肝省風兼服濟陰丸

生地 三錢

製首烏 二錢

當歸

乾葛

各一錢五分

秦艽

丹皮

甘菊

荊芥 各一錢 薄荷 五分

甘草 三分

水煎午後臨睡服

遍身風疹作癢

生芝蔴研碎擦之

又方

過年貼過掛絡擦之

又

鹽蒲包煎湯洗之

風疹不時舉發

真蘇油

燒

酒

各半
酒杯

和勻燉熱發時服之再不發矣

葡萄疫門主論

陳實功曰葡萄疫乃小兒感受四時不正之氣鬱於
皮膚不散結成大小青紫斑點色若葡萄發在偏
體頭面乃爲腑症自無表裏如邪毒傳胃牙根出
血久則虛人斑方漸退初起宜服羚羊角湯清熱
涼血久當滋益其內又有牙根腐爛者人中白散
主之 正宗

心法曰此證惟腿脛居多

葡萄瘦門主方

羚羊角散 正宗

羚羊角 防風 麥門冬 玄參

知母 牛蒡子 黃芩 各八分 生甘草 二分

淡竹葉十片水二鍾煎六分食遠服

胃脾湯 正宗

北五味 五分 白朮 遠志肉 陳皮

沙參 麥門冬 茯苓 生甘草 五分

水二鍾煎六分食遠服 如虛弱自汗者去沙

參加入參黃芪各五分

非疳散

治葡萄疫攻牙疳爛

五倍子

炒茶褐色

人中白

煨各一兩

冰

片

四分

研細用米泔水漱淨吹

濕痰流注門主論

陳實功曰流者行也注者住也由其瘀壅其形漫腫
無頭皮色不變所發母論穴道隨處可生皆緣榮
氣不從逆於肉裏如風寒相中表症發散未盡者
散之房慾之後陰虛外寒所侵者溫之惱怒傷肝
鬱結傷脾者歸脾湯加青皮香附散之跌撲損傷
瘀血凝滯者和血湯逐之產後惡露未盡流注經
絡而成者木香流氣飲導之如不得內消者法當
大養氣血培助脾胃溫煖經絡通行關節十全大

補湯加熟附子香附主之如膿已成宜急開之

正宗

王肯堂曰不串流者俗曰馬瘕 串流者名曰走散

流注俗曰瓜藤馬瘕 遍身骨節內疼痛不能起

坐無堆作熱不退者名曰啣骨馬瘕 若脊骨及

髀骨上起堆或一二個或三五個名曰過脊馬瘕

若尾骶骨上起堆作熱者名曰殺着馬瘕 若

髀骨下痛甚無堆但腫者名曰鎖腳馬瘕 若骨

相交接之處疼痛無堆微腫名曰接骨馬瘕 此

證因風熱走散四肢治當疎風散熱初起不可用

火針烙之腫勢盛者只宜刺以稜針久熟者可火
針烙之流注入股者死

準繩

又曰禁用寒涼尅伐內消等劑

汪省之曰夫流者行也乃氣血之壯自無停息之機
注者住也因氣血之衰有凝滯之患故行者由其
自然住者由於瘀壅凡得此者多生於體虛之人
勤勞之輩不慎調變夏秋露卧縱意取涼熱體當
風或中風邪發散未盡或慾後陰虛外寒所侵又
或惱怒傷肝鬱結傷脾榮氣不從逆於內裏又或

跌打損傷瘀血凝滯或產後惡露未盡流縮經絡
皆成斯疾也初起外以琥珀膏敷貼內服行氣活
血之劑其中十可消其五六如不得內消者法當
大養氣血培助脾胃溫煖經絡通行關節如木香
流氣飲十全大補湯俱加熟附子香附培助根本
庶未成自消已成自潰已潰自斂不致殘敗破漏
不斂之證且如有膿宜急開之忌用寒涼剋伐內
消等藥犯此終至不救者多矣

理例

朱丹溪曰凡人身上中下有塊者是痰然痰在皮裏

膜外則遍體遊行腫而色白滯而不痛宜導達疎利如痰因火動而走則體多小塊色紅痛甚流走無定宜解毒清火爲主

又曰痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不能通痰在腸下非白芥子不能達白芥子亦能散皮裏膜外之痰氣竹瀝滑痰非薑汁不能行經絡痰在四肢非竹瀝不開

申斗垣曰三陽經傷寒發汗不透則必痛痛久則腫腫久則赤而熱熱久則破壞此名陽濕痰破瘡如

三陰經失汗汗鬱成痰則痛痛久則皮色不變而
腫至夜痛反甚其痛處冰冷脉亦沉細日久氣血
凝注則肌死肌死則破壞腐臭名曰陰濕痰破瘡
均宜艾灸 啟玄

又曰冷流注多附骨硬不消骨寒而痛筋縮不能伸
屈庸俗誤用刀針又無膿血止有如屋漏汁或痰
黑血宜用回陽玉龍膏如稍緩再加軍姜內桂白
芷草烏等分熱酒調敷則骨寒除而痛自止氣溫
和而筋自伸肉亦軟而腫自消亦不可無石菖蒲

以其性能破堅散腫最妙亦不可多多則解羣藥性也

又曰流注首尾敷冲和膏最穩加乳香沒藥治流注筋不能伸敷之極効

又曰走散流注發因受寒凍凝滯血脉而成一名流注傷寒又名瓜藤發背患生於背遍身皆有之經云傷寒流注尚猶可流注傷寒急如火醫者當察其寒熱虛實治之

胡公弼曰流注又曰走注狀似蟹形毒因風盛而生

熱氣因熱盛而走散午前宜四君子湯加芎歸午
後宜四物湯加參芪麥冬北五味斷不可用滲利
流氣等藥

青囊

又曰治流注大法鬱者開之怒者平之閃撲及產後
瘀血者散之傷寒餘邪者調解之大要以固元氣
爲主佐以現證之藥

又曰流注一箇要表汗一次如流注三個須表汗三
次毒自消矣設治之不早深爲大害

又曰如破潰成膿者先用降藥降去敗肉腐盡生肌

可也

醫林集要云白虎飛尸留連週暮或展轉數歲冷毒
朽骨出盡自愈若附骨腐者可痊正骨腐者則爲
終身廢疾矣

又曰又有結核在項腋或兩乳傍或兩胯軟肉處名
爲瘰癧屬冷症也又有小兒宿痰失道致結核
於頸項臂膊胸背之處亦冷症也並宜熱藥敷貼
王西園曰流痰胸腹流於四肢者可治四肢流入胸
腹者難治

心法曰流注初發漫腫無頭皮色不變凝結日久微熱漸痛透紅一點方是膿熟卽宜用針開破若濕痰化成者膿色黏白若瘀血化成者膿色金黃黏水若風濕化成者膿色白稀如荳汁若汗後餘邪化成者膿色或黃或黑稀膿臭穢以上四證發於肉厚處可愈發在骨節及骨空處難痊若淫慾受寒化成者膿色稀白而腥其水中有猪脂水油之狀此爲敗漿膿也諸書雖有治法終成敗證

馮魯瞻曰按臟腑津液受病爲痰隨氣升降理之常

也若在皮裏膜外及四肢關節曲折之地而臟腑之痰何能流注其所此卽本處津液遇冷遇熱卽凝結成痰而爲病斷非別部之津液受病成痰舍其本位而移於他部者况氣本無形故能無微不達而液隨氣運亦可藉氣周流若至津液受病成痰則變爲有形而凝滯焉能隨氣流通於至微至密之所耶

試痰法 用海蜃皮貼上外以膏貼之如痰次日膏藥揭得下海蜃皮揭不下卽是害痰

流注門主方

香附餅 正宗

治風寒流注襲於經絡結成腫痛

香附爲末酒和量瘡大小做餅覆患處熱熨斗熨藥餅上未成者自消已成者自潰風寒濕毒宜薑汁作餅熨之

醒脾湯 正宗

治懷抱鬱結思慮傷脾以致脾氣不行逆於肉裏乃生壅腫疼痛不眠心煩不安神氣不清

人參

白茯苓

白朮

嫩黃芪

蜜炙

酸棗仁

炒研

遠志肉

各一錢

地骨皮

七分

桔梗

柴胡

川黃連

廣木香

炙甘草

香

附

各五分

圓眼肉

七枚

薑三片棗二枚水二鍾煎八分不拘時服

琥珀膏

正宗

治一切皮色不變漫腫無頭氣血凝滯結成流毒母論身體上下年月新久但未成膿者並效

生大黃

二兩

鬱金

白芷

天南星

各一兩

共爲細末用大蒜去殼搗爛入上藥再搗畧入酒一二匙調勻遍敷腫上紙蓋隨有熱痛又有不痛俱待藥乾便效次日又有起泡又有不起泡者如有起泡挑去泡中黃水以膏貼之自效調中大成湯

治流注潰後膿水清稀飲食減少不能生肌收斂

人

參

二錢

白

木

嫩黃芪

炙

陳

皮

當歸身

山藥

白茯苓

白芍藥酒炒

牡丹皮

各一錢

遠志肉

砂仁

藿香

炙甘草

各五分

熟附子

上肉桂

各八分

煨薑三片 黑棗二枚 煎食遠服

黃芪六一湯

治流注潰後膿水出多口乾作渴煩躁不寧

嫩黃芪

六錢生用 蜜炙各半

粉甘草

一錢五分 生炙各半

人參

一錢

水煎食遠服

木香餅

一切氣滯結腫成核或痛或酸閃肭風寒所致

生地黃

搗膏

廣木香

減半研末

和勻量患處大小作餅置腫上以熱熨斗熨之堅硬木痛者間日熨之自效

流痰渾身作痛

當歸

瓜蒌仁

獨活

大川芎

白茯苓

白芷

白芍藥

連翹

防己

穿山甲

炒

防風

生地黃

金銀花

牛膝

玉花粉

黃芩

陳皮

川貝母

甘草

各五錢

分作六劑酒水全煎若上半身痛食後服下半身痛食前服如遍身痛只用酒煎神效

火龍膏

治風寒暑濕毒襲經絡筋攣骨痛或肢節煩痛濕痰流注作痛不能行步鶴膝風歷節風疼痛其效尤速

生薑半觔取汁牛皮膠二兩入鍋內化開入乳香沒藥末各五錢麝香一錢調勻待溫攤貼患處

濕痰流注奇方 賴君子

木瓜 一個 當歸 五錢 甘草 三錢

細酒一觔全煎減半再加研細乳香沒藥各一錢露一宿空心熱服未潰自消已潰自斂

濕痰內消方

宣木瓜 五錢 紫花地丁 一兩五錢

臘酒二觔煎好露一宿看症上下分食前後服內消濕痰流注神方

吉祥草根洗淨搗汁半酒杯和酒沖服取汗即消

且不生瘡毒

錦囊秘授神效觀音救苦丹

洪魯贈

神治一切風寒濕氣流注作痛手足蹇攣小兒
偏搐口眼喎斜婦人心腹痞塊攻疼不問年深
月久將藥置患處以燈火點着候至火滅連灰
黏於肉上立見痊愈重者用藥米粒大輕者用
藥米粒大只須一壯不必復炙若患處潤大連
排數壯一起炙之且炙時不甚熱痛炙後並不
潰膿一茶之頃痼疾如失屢試屢驗真神方也

因思濟之一方不若利之天下惠之一時不若
澤之後世特附於錦囊之中以廣厥傳願後賢
以爲半積半養之珍幸勿專爲嗜奇嗜利之具
麝香一錢 硃砂二錢 硫黃三錢
各研細末先將硫黃化開次入硃麝同化傾入
磁器內候乾再研末隔火化開候開切作如糝
如米大貯磁瓶內慎勿出氣珍藏聽用
一切腫塊濕痰流注

鮮山藥

天

麻

各五錢

酒水各一鍾煎服三劑全消

敷痰 賈頌鳳

大蒜頭十數枚去皮入皂礬三錢搗爛聽用用香
一炷點起將藥敷患上以一炷香盡爲度如是痰
卽現青紅色如只紅色則非痰也如是痰隔日敷
之三次自消

又方

天南星

大黃

白

芟

各等分

研細薑汁和醋調敷

又方

白蘿蔔葉

扁栢葉

向北者

乾

麵各等分

研細醋調敷日易一次自消

敷濕痰腫痛癰疽發背無名腫毒

五倍子

瓦焙黃色

生半夏

生南星

各等分

共研細全滴醋熬數沸加菰蘆汁調敷痛處留頭如藥乾用醋不時潤之至重毒證不過三四次即消

敷痰法

生山藥一段洋糖飛麵共搗爛塗敷自消

摩腰紫金丹 活人錄

風寒濕三氣而兼痰飲留滯於經絡血脉之中
閉塞不通而痛並治腰痛

附子尖

烏頭尖

天南星

各二錢五分

雄黃

樟腦

丁香

香各一錢五分

吳茱萸

肉桂

硃砂

乾薑

各一錢

麝香

二分

蜜熬菰汁和丸如雞頭子大每丸以薑汁化開

敷塗患處上貼萬靈膏或蠲痛膏

蠲痛五汁膏

寒濕氣襲於經絡血脉之中爲痛痛於兩臂兩
股腰背環跳之間

鳳仙梗

搗汁

老薑汁

蒜汁

菰汁

韭汁

各等分

熬至滴水成珠用草蓆子油同黃蠟收起每以
此膏烘熱貼上追出濕氣水液自愈

消痰方

芫花研末一錢棗肉搗勻爲丸在上食後服在下
食前服白湯送下卽便出穢痰其腫立消但此法
宜施於壯實初起之人須忌甘草

又方

乳香去油

沒藥去油各一錢川貝母去心研二錢

連翹八錢

萬年青三片

煎服自消

雷火針

風寒濕氣痰滯於經絡血脉之中閉塞不通而

痛

蕲艾一兩

硃砂二錢

穿山甲土炙

桃皮

草烏

川烏

乳香

雄黃

沒藥

硫黃各一錢麝香五分

共爲細末以蕲艾鋪粗紙上入藥末三錢捲成筒如爆竹式擇吉日將藥筒入瓶內以箬葉油紙封口埋屋下地中四十九日取出任用此針能針百病可於患處用青布或紅布摺二十四

層將針燈上點着吹息隔布針之患內煖極卽止不過三次卽愈

治因氣鬱痰生於頸項皮膚腫硬白色不甚痛疼說約

天南星半夏研末薑汁調敷或南星半夏末薑汁和餅隔蒜炙更妙

消痰神方

新鮮針線包

卽蘆洲上蘆柴上纏擾之物形如鳥首綠色內有白漿秋深冬月白漿乾

枯裂開便如毛絮者是也不拘多少搗爛敷上自消

痰注臂痛

湯仁齋

天仙籐

白 朮

羌 活

白 芷

各三錢

姜

黃

六錢

製半夏

每服五錢薑五片水煎服

濕痰腫痛經年不能行者

單方

水紅花

花 椒

蘿蔔莢

甘 草

槐 花

金銀花

蒼 朮

白鳳仙花

水龍骨

各等分

薺 荻 草

煎薰患處水稍溫卽洗之

神仙外應膏

秘方

川烏一觔爲末用陳醋入砂鍋內慢火熬如醬色
敷患處如病一年敷後一日發癢二年二日發癢
癢時令人將手拍癢處拍至不癢爲度先用升麻
皮硝生薑煎水洗然後敷藥不可見風

濕痰流注初起腫痛無頭皮色不變久而不治則發
熱作膿知覺早者於未破時急服此方十餘劑卽能
內消最稱靈驗

橘紅

防風

秦艽

木通

各一錢

眞膽星

二錢

川貝母

薑 蚕 炒 槐 花 炒 五 倍 子

金 銀 花 各 三 錢 防 已 八 分 白 甘 遂 刮 去 皮 未 七 分

皂 角 子 鮮 者 敲 碎 九 個 肥 皂 子 鮮 者 敲 碎 十 個 土 茯 苓 礞 鋒 刮 皮 打 碎 四 兩

虛 弱 人 加 石 斛 苡 仁 各 一 錢

痰 在 頭 頂 胸 者 加 夏 枯 草 一 錢

痰 在 背 脊 者 加 羌 活 五 分

痰 在 脇 肋 者 加 柴 胡 五 分

痰 在 肚 腹 者 加 赤 芍 澤 瀉 各 一 錢

痰 在 臂 者 加 獨 活 五 分

痰在腿脚者加

木瓜 二錢 牛膝 一錢五分

右用河水九碗砂鍋內煎三碗每日早中晚各
熱服一碗如痰在心之上者食後服痰在心之
下者食前服如虛弱人分二劑極虛者分三劑
小兒分四劑忌食鹽醬茶醋猪肉鮮魚雞鷺鴨
一切發物煎炒薑椒烟酒生冷但藥內有甘遂
與甘草相反恐別樣丸散內有甘草者切不可
服已破頭者止服四五劑使氣血調和不致又
流他處隨服十全大補湯加川貝母 二錢 石斛 五分

錢二滴乳香去油四分須服數十劑方能全愈若係多

火之人十全大補湯內減去肉桂願體集

治流注抄本

石膏一兩 官礪三錢

飛麵作十丸將丸穿一孔貫以鉄線炭火煨紅
取酒一碗投入冷又燒紅入酒內以丸盡爲度
其酒熱卽服一日二服自消

又方

金銀花 紅花 各三錢
地榆

苦參 各二兩

酒水各半煎服近者三劑遠者七劑卽消

神驗方 周鶴仙

用薑黃母子

是大薑黃身上小釘子是也

研末將小紅棗去核

藥末入內填平用絲綿裝緊塞入鼻孔內隨量飲醉蓋煖出汗已潰者自然全愈未潰者內消神效之極鼻孔照男左女右塞之藥不可經婦人手

又方

野花椒

山茱萸 各半觔

用酒浸煮三炷香冷定將酒盡量飲醉發汗一身其毒自散神效

又方

金銀花帶葉和酒糟研爛用淨瓦罐盛藥火中煨熱敷患處立愈

濕痰初起一劑消

蘊公和尚

歸尾

大貝母

黃芩

川牛膝

木瓜

白茯苓

檳榔

陳皮

各一錢

牡蠣

金銀花

玉木鱉

白殭蠶

各一錢五分

熟大黃

三錢一方去大黃用揚州產紅芽大戟加五分加至八分一錢止取效更速

用無灰酒一觔煎一半空心熱服取汗行二三

次搗用酒半觔煎四兩再服

立消渾身上下濕痰並消一切無名腫毒

穿山甲

大片者土炒七錢 鬧羊花 一兩

猪牙皂

炒一錢

羌活

四錢

共研細末每服一分八厘加洋糖三錢熱酒調

下

消痰神方 楊警愚

無論流痰敗痰腋核如已經貼有膏藥敷藥內
膿已成者務將膏藥揭去敷藥洗淨然後服藥
一服十消五六至重者不過三服

穿山甲 炒

生大黃

生明礬 各四兩

杏

仁 去皮二兩

右四味俱用礮槽研極細末切不可磨若磨則
不效每服三錢痰在上部食後服痰在下部食
前服俱用木瓜酒調下孕婦忌服

流痰

紫花地丁

一兩
五錢

宣木瓜

五錢

臘酒二觔煎一觔露一宿痰在上身食後熱服

痰在下身食前服之每日一劑三日後自消脩

服時忌經陰人手

敷流痰

王西園

生大黃

天南星

白

芡
各等分

共研細末生薑汁江醋調敷

敷流痰

張漁山

白蘿蔔葉 搗

朝北扁柏葉 搗

飛麵

和杵敷上一日一換三日即消敷上宜益暖出

汗

敷痰 徐聲士

土子 漆匠熬桐油的

生半夏

川烏

生南星

草烏 各等分

研細末桐油調敷

敷痰

石灰

當歸尾

皮硝

穿山甲

川烏

薄荷葉

草

烏各五錢

生大黃

一兩

研細末鹽酒打糊調敷

濕痰流注

葱

汁一飯碗

鳳仙花

一棵搗汁如無鮮者即用乾者一棵研末

先將二汁熬稠入廣膠二錢焙化再加入中白

細末二錢和勻攤膏貼

又方

蒜

瓣三十瓣

皂

礬三錢

共搗爛敷一炷線香時卽洗去次日再敷起泡
無妨

又方

乳香去油

沒藥去油

雄黃各三錢

麝香三分

大蜈蚣一條

研細末用黃蠟三錢熔化爲丸每服三錢陳酒
送下隨量飲醉出汗自消

濕熱流注杜秘

連翹心八錢

乳香去油

沒藥去油

廣木香 各五分

引加萬年青葉七片開口花椒四十九粒水煎

服後飲木瓜酒 體壯人加黑白丑 一錢

消痰 吳天序

甘草 三錢 金銀花 羌活

天花粉 各一兩 蒲公英 紫花地丁 各二兩

消痰 胡學海

白水煎加無灰酒儘量服出汗如糊一劑即消

猪牙皂 一錢五分 蜈蚣 三條 全蝎 五個

乳香 去油

川貝母

穿山甲

明雄

沒藥

去油各三錢

麝香

五分

共研細黃蠟熔化爲丸每服三錢木瓜酒下

消三十六種痰塊仙方

劉介奉

九頭獅子草

川貝母

甜味者佳各一觔

共磨細末無灰酒跌丸大人每服三錢小兒減

半木瓜酒送下或開水亦可不過三服必消孕

婦忌服

消痰神方

黑

棗

八兩去
皮核

老鼠花

買三文錢
研細

全棗肉爲丸如核桃大每服一丸白湯嚼下如
是痰服後必腹痛吐的也是痰扇的也是痰候
行過數次用溫粥一盞喫之卽止其痰卽消如
未消盡明日再服消盡爲度

股痛門主論

風寒氣鬱於皮毛致血不榮於肌表皮槁多痛手足
似無皮之狀是股苦生焉先將熱湯洗淨潤肌膚
擦之就煖勿見風冷自愈如每逢冬卽發者須三
伏時晒搗爛大蒜間擦三次不再發經云寒因熱
治其理甚明

傷寒瘧後發腫門主論

傷寒愈後浮腫若因水氣者宜利之若胃虛食少者
宜五苓散加蒼朮陳皮木香砂仁之類胃不虛者
以商陸一味煮粥食之亦妙傷寒太病瘧後足腫
者不妨但節飲食戒酒色胃氣強腫自消也

傷寒身癢門主論

凡陽明反無汗皮中如蟲行者胃主肌肉陽明久虛也宜朮附湯黃耆建中湯主之如風熱盛身癢發熱無汗口燥舌乾大小便秘澀者宜防風通聖散加羌活主之如風證身癢者宜小續命去附子加白附子主之如血虛身癢者宜四物湯加浮萍蒺藜防風主之

身上虛癢者是血不榮於腠理也用四物湯加黃芩煎調浮萍末服之

腫塊門主論

虛怯人氣血乖違肢體患腫塊或痛或不痛或風襲
於經絡肢體疼痛或四肢筋掣骨痛宜用熨熨法
其腫自消此外補陽氣而運散壅滯之法也

腫塊門主方

葱熨法

葱頭細切搗爛炒熱熨患處冷則易之再熨腫處
自己卽跌打損傷腫痛亦用此法

凡有腫塊處

糯米一二合炊飯或粽子煮熟乘熱入鹽少許加
切碎葱數根白酒麴一小丸全搗極爛如膏烘熱
貼患處油紙及布包縛住自消

又方

白朮一二九爲末炒枯熱酒調敷即可內消
消塊止痛丹 米鑑

人參

半夏

白朮

錢各三

黃芪

薏苡仁

白茯苓

錢各五

羌活

防風

錢各一

桂枝

錢五分

水煎服二劑輕四劑止二十劑消盡

汗斑門主論

張仲景曰汗斑乃暑熱之時人不知而用日晒之手
巾擦其身上之汗便成此病最無害而難愈宜內
服蒼耳丸主之

汗斑門主方

驗方

硫黃

鉛

粉

各等分

共研細用生薑切片蘸擦初則變黑次則轉紅紅退則愈

又方

密陀僧

鉛

粉

各等分

研勻生薑蘸擦

又方

用厚布一尺以白砒研極細末雞蛋清和勻漿於布上拍勻晒乾不時擦之數日卽愈兼治一切頑癬如神

汗斑肥皂

硫黃

雄黃

白砒

明礬

密陀僧

各一兩

肥皂

去筋弦膜淨六兩

其搗爲大圓擦汗斑上停一頓飯時洗去將手巾另用清水搓過切不可擦臉恐有氣息攻目

汗斑

錢懷谷

先將生薑切片擦汗斑上再以薑汁調川貝母細末搽上過宿洗去

汗斑

粗夏布一塊用瓦上青苔不是瓦上長瓦松將井水洗淨

搗汁浸布晒乾用白芷一兩硫黃五錢全炒以雞研細

蛋清調勻藥在布上晒乾以布擦斑上自愈

又方

密陀僧

硫

黃

各一錢

冰

片

一分

研細燒酒調搽

又方

白礬砂研細擦之即褪

汗斑 楊警愚

北細辛

白

芷 各二錢

硫

黃

一錢

共研極細末用花紅連蒂切一片蘸擦除根

赤白汗斑

劉進士

雄黃

硫黃

全

錢

白僵蠶

白附子

密陀僧

各五分

麝香

以上共為末蘸生薑於患處擦之五日除根終